

AANVRAAGBON PIJNTHERAPIE AZJP Vilvoorde



AZ JAN PORTAELS
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde

Vignet

Naam:

Geboortedatum:

DATUM AANVRAAG: ___/___/20___

<u>Pijnprobleem/ Pijndiagnose:</u>	
Beeldvorming uitgevoerd?	☐ ja: referentiecode bijvoegen a.u.b. ☐ nee
EMG uitgevoerd?	☐ ja: resultaat bijvoegen a.u.b. ☐ nee

Aangevraagde procedure:

TECHNIEK	NIVEAU	ZIJDE
Transforaminale (TFE) ➔ CT of MRI		Links Rechts
Cervicale epidurale (CEI) (<i>graag consultatie vooraf</i>) ➔ MRI noodzakelijk		
Diagnostisch wortelblok (in voorbereiding op PRF DRG <i>binnen de 3 maanden</i>) ➔ CT of MRI		Links Rechts
Diagnostisch MBB (facetblok in voorbereiding op RF <i>binnen de 3 maanden</i>)		Links Rechts
SIG		Links Rechts
Andere: graag consultatie vooraf		

Aandachtspunten:

Bloedverdunners:

- Specifieer:
- Laatste dosis op:
- Vervangen door LMWH:
 - Laatste dosis LMWH op:

➔ Richtlijnen zie achterzijde of website AZJP

Andere aandachtspunten:

Wanneer stoppen met bloedverdunners/ wanneer vervangen

Asaflow	niet stoppen	
Plavix (Clopidogrel) Brilique (Ticagrelor)	7 dagen stoppen	niet stoppen bij laag risico procedure**
Ticlid (Ticlopidine) Efiënt (Prasugrel)	10 dagen stoppen	niet stoppen bij laag risico procedure**
Xarelto (Rivaroxaban) Eliquis (Apixaban) Lixiana (Edoxaban)	48 uren stoppen	24 uren stoppen bij laag risico procedure**
Pradaxa (Dabigatran)	48 tot 96 uren stoppen, afhankelijk van de nierfunctie	24 tot 48 uren stoppen bij laag risico procedure**
Sintrom	4 dagen stoppen	vervangen door LMWH *
Marcoumar	10 dagen stoppen	cfr huisarts
Marevan	7 dagen stoppen	vervangen door LMWH *
Fraxiparine 0,4 / Clexane 40 / Innohep 0,35	12 uren stoppen, cfr nierfunctie	vervangen door LMWH *
Fraxiparine > 0,4* / Clexane > 40* / Innohep > 0,45 / Fraxodi	24 uren stoppen, cfr nierfunctie	cfr huisarts

**facetten lumbaal/thoracaal
SIG infiltratie
perifere zenuwbloks

versie mei 2020